



Fundusze Europejskie

dla Rozwoju Społecznego

Zrównoważony Kampus SGGW – - kształcenie na rzecz branż kluczowych

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Priorytet 1 Umiejętności

Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SZKOŁA GŁÓWNA
GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO

PROPEDEUTYKA ZOOTECHNICZNA

MAŁE PRZEŻUWACZE

Zdjęcia: Internet

Systematyka

- Podrząd – przeżuwacze
 - Rodzina – pustorogie
 - Rodzaj – owca – *ovinaea*
- Gatunek – owca domowa – *ovis aries*
- Udomowienie owiec – ok 20 tys. lat temu
- Miejsce udomowienia – stepy aralsko-kaspijskie

Przodkowie owcy domowej - *Argali (ovis ammon)*



dzika owca azjatycka. Silna budowa ciała, mocne nogi i ogromne, szeroko rozstawione rogi.

Masa ciała tryków pow. 200 kg Występuje na terenach górskich: Kamczatka, Himalaje. Od niego pochodzą owce tłustopośladkowe (owca gisarska) i tłustoogoniaste



Owca tłustopośladkowa



Muflon (*ovis musimon*)

(w tym muflon europejski) występuje od gór Iranu po Cypr i Korsykę.

Przodek północnoeuropejskich owiec krótko ogoniastych (wrzosówka, fińska)




WRZOSÓWKA POLSKA



OWCA FIŃSKA

Przodkowie owcy domowej - Archar (*ovis vinei archar*)



mniejszy od argala.

Występuje w niższych partiach górskich oraz na obszarach stepowych. Prekursor owiec długoogoniastych.



OWCA DŁUGOOGONIASTA


Typy użytkowe owiec

Typ użytkowy **wełnisty**



MERYNOS WEŁNISTY

Strzyża



Typ użytkowy mięsny



SUFFOLK

TEXEL



Typ użytkowy kożuchowy



OWCA ROMANOWSKA



WRZOSÓWKA POLSKA

Typ użytkowy smuszkowy



KARAKUŁ

KARAKUŁ



Futro karakułowe

Typ użytkowy **mleczny**



WSCHODNIOFRYZYJSKA OWCA MLECZNA

Typ użytkowy mięsno-wełnisty



LINCOLN



KENT

Rasy owiec w typie **mięсно-wełnistym**



MERYNOS POLSKI



POLSKA OWCA NIZINNA

Typ wszechstronnie użytkowy



OWCA FIŃSKA



POLSKA OWCA GÓRSKA

Grupy owiec w stadzie


Matka = Maciorka

podstawowa jednostka stada o pełnym cyklu produkcyjnym używana do rozrodu



Tryki

samce używane do rozrodu



Jagnięta

od urodzenia do 3,5 miesiąca życia



Jarlaki

od 3,5 miesiąca życia do 1 roku



Młode maciorki remontowe

zastępują w następnym roku matki wybrakowane ze stada



Rodzaje budynków dla owiec

budynki zamknięte



Rodzaje pomieszczeń dla owiec

wiata półotwarta



Rodzaje pomieszczeń dla owiec

Wiata półotwarta



Wybiegi (okólniki)



Wypas owiec na hali



Autor utworu:

Martyna Batorska



CC BY 4.0

Material jest udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl>

Material opracowany w związku z realizacją projektu „Zrównoważony Kampus SGGW - kształcenie na rzecz branż kluczowych ” nr FERS.01.05-IP.08-0067/23



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SZKOŁA GŁÓWNA
GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO